

Памятка по профилактике энтеровирусной инфекции
(для дошкольных и школьных образовательных учреждений)

Энтеровирусная инфекция – группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами (более 90 типов) и характеризующихся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых с поражением оболочек мозга, сердечной мышцы, периферических нервов. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении.

Максимальная заболеваемость регистрируется в летне-осенние месяцы. Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) характеризуется высокой контагиозностью и быстрым распространением заболевания.

Меры профилактики энтеровирусной инфекции в дошкольных и школьных образовательных учреждениях (в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» р.ХХХIII «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»):

- проведение обязательных утренних фильтров с опросом родителей о состоянии здоровья ребенка, осмотром кожных покровов и видимых слизистых и термометрией у детей;
- допуск в группу или класс только детей без признаков инфекционного заболевания, при выявлении во время нахождения в группе в течение дня у ребенка симптомов, не исключая инфекционное заболевание обеспечение его немедленной изоляции, консультации врачом педиатром (инфекционистом),
- своевременное (в течение 1 часа) выяснение причин отсутствия ребенка в образовательной организации,
- наличие в образовательной организации достаточного запаса термометров, одноразовых шпателей, моющих и дезинфицирующих препаратов,
- жесткий контроль за проведением обработки овощей и фруктов, используемых в питании детей;
- использование для питья детей воды гарантированного качества;
- неукоснительное соблюдение правил личной гигиены персоналом, постоянный жесткий контроль со стороны персонала образовательной организации за соблюдением детьми правил личной гигиены;
- при регистрации в образовательной организации случая энтеровирусной инфекции или подозрении на это заболевание немедленное проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий, в том числе приостановка работы бассейна (при наличии его в организации).